# DM1: Optique géométrique corrigé

Vous devez rendre une copie par groupe de 3 (ou 2, mais je préfère 3). Attention, tous les membres du groupe doivent avoir fait tout le DM! Il ne s'agit pas de partager le travail.

### Exercice 1 : BOMBE ATOMIQUE

- 1. On utilise par exemple l'expression de l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2}mv^2$  et on obtient directement que la dimension d'une énergie est  $\overline{\dim(E) = ML^2T^{-2}}$ .
- 2. L'équation aux dimensions correspondant à l'équation  $R=E^at^b\rho^c$  est

$$L = (ML^{2}T^{-2})^{a}T^{b}(ML^{-3})^{c} = M^{a+c}L^{2a-3c}T^{-2a+b}$$
(1)

Ce qui donne le système d'équations

$$\begin{cases} 0 = a + c \\ 1 = 2a - 3c \\ 0 = -2a + b \end{cases}$$
 soit après résolution 
$$\begin{cases} a = \frac{1}{5} \\ b = \frac{2}{5} \\ c = -\frac{1}{5} \end{cases}$$
 (2)

- 3. On déduit de la question précédente que le rayon s'écrit comme  $R=E^{1/5}t^{2/5}\rho^{-1/5}$  soit  $E=\frac{R^5\rho}{t^2}$
- 4. Sur la photographie, on estime  $R=150\,\mathrm{m}$  et  $t=25\cdot 10^{-3}\,\mathrm{s}$ , ce qui donne une énergie de  $E=1,2\cdot 10^{14}\,\mathrm{J}$
- 5. Le résultat obtenu par analyse dimensionnelle donne une puissance libérée d'environ 30 kilotonnes de TNT . C'est une très bonne approximation de la valeur réelle, compte tenu de la méthode utilisée pour obtenir ce résultat.

2025-2026 page 1/3

#### Exercice 2: Localisation d'une épave

## I – Découverte de l'épave




FIGURE 1 – Schéma de la situation, l'épave n'a pas été représentée.

- 1. L'indice de réfraction d'un milieu détermine la vitesse de la lumière dans ce milieu. La vitesse de la lumière dans un milieu d'indice n est  $v = \frac{c}{n}$ , où c est la vitesse de la lumière dans le vide.
- 2. Au point A, le rayon lumineux frappe l'eau sous incidence normale, donc l'angle d'incidence est nul. Dans ce cas, l'angle de réfraction est également nul et le rayon n'est pas dévié.
- 3. Lorsque le miroir tourne d'une angle  $\alpha$  par rapport à l'horizontale, la normale au miroir tourne d'un angle i par rapport à la verticale. On a donc  $i = \alpha$ .
- 4. D'après les lois de la réflexion, on a  $\overline{i'=i}$  et donc  $\overline{i'=\alpha}$ .
- 5. Les angles i + i' et  $\theta$  sont alterne-internes, donc égaux. On a donc  $\overline{\theta} = 2\alpha$ .
- 6. Au point C, le rayon lumineux est réfracté vers l'extérieur de l'eau et une partie est réfléchie vers le fond.
- 7. D'après les lois de la réflextion, on a  $\overline{\theta' = \theta = 2\alpha}$ . On applique ensuite les lois de la réfraction au point C et on obtient  $n_a \sin(\varphi) = n_e \sin(\theta)$ , donc  $\overline{\varphi = \arcsin\left(\frac{n_e}{n_a}\sin(\theta)\right)} = \arcsin\left(\frac{n_e}{n_a}\sin(2\alpha)\right)$
- 8. (a) Dans le triangle CDD', on a  $\overline{CD' = H \tan(\varphi)}$ .
  - (b) De la même manière, on a directement  $\overline{AC = h \tan(\theta)}$  .
  - (c) On a  $BD'' = AC + CD' = H \tan(\varphi) + h \tan(\theta)$ . En utilisant les expressions de  $\varphi$  et  $\theta$  obtenues avant, on obtient

$$BD'' = H \tan \left( \arcsin \left( \frac{n_e}{n_a} \sin(2\alpha) \right) \right) + h \tan(2\alpha) \approx 18 \,\mathrm{m}$$
 (1)

On peut raisonnablement penser qu'un plongeur bien entrainé puisse parcourir cette distance en apnée.

9. On a  $D'E=\frac{CD'}{\tan(\theta)}=H\frac{\tan(\varphi)}{\tan(\theta)}$  et en utilisant les résultats précédents, on a

$$D'E = H \frac{\tan\left(\arcsin\left(\frac{n_e}{n_a}\sin(2\alpha)\right)\right)}{\tan(2\alpha)} \approx 2.0 \,\mathrm{m}$$
(2)

### II – Pourquoi l'épave n'a-t-elle pas été détectée auparavant?


10. Au point C la lumière passe d'un milieu d'indice élevé à un milieu d'indice plus faible, il peut y avoir un phénomène de réflexion totale si l'angle d'incidence au point C est trop grand.

2025-2026 page 2/3

- 11. La démonstration est faite dans le cours, on a  $\theta_{\lim} = \arcsin\left(\frac{n_a}{n_e}\right)$  et donc  $\alpha_{\lim} = \frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{n_a}{n_e}\right) \approx 24^{\circ}$
- 12. Avant que le crabe ne fasse bouger le miroir, l'angle  $\alpha$  était supérieur à  $\alpha_{\lim}$ , il était donc plus grand car maintenant l'angle  $\alpha$  est plus petit que  $\alpha_{\lim}$ .

### III – Où le pêcheur voit-il le bateau lorsqu'il est hors de l'eau?

### 13. Schéma



- 14. On utilise les lois de la réfraction, et on a directement  $n_e \sin(\varepsilon) = n_a \sin(\varepsilon')$ . Comme on considère que ces angles sont très petits, on obtient  $n_e \varepsilon = n_a \varepsilon'$ .
- 15. On a  $AA' = h \tan(\varepsilon) \approx h\varepsilon$ . On a ensuite  $AB' = \frac{AA'}{\tan(\varepsilon')} \approx \frac{AA'}{\varepsilon'}$ . Soit finalement  $AB' = h\frac{\varepsilon}{\varepsilon'} = h\frac{n_a}{n_e} \approx 15\,\mathrm{m}$ . L'épave semble bien moins profonde que ce qu'elle n'est en réalité.

2025-2026 page 3/3